

TABLA IV

Para cada principio activo y vía de administración (SNG o SE) recoge la forma farmacéutica aconsejada y el modo de preparación, así como algunas observaciones de interés

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
ABACA VIR	ZIAGEN Comprimidos Solución	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. No se recomienda emplear la solución por su elevado contenido en sorbitol (70%).
ABACA VIR LAMIVUDINA ZIDOVUDINA	TRIZIVIR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
ACAMPROSATO	CAMPRAL Comprimidos				Los comprimidos son de liberación sostenida, valorar la posibilidad de sustituir por otro principio activo como carbimida o disulfiram.
ACARBOSA	GLUCOBAY GLUMIDA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar inmediatamente antes de la NE.
ACECLOFENACO	AIRTAL FALCOL Comprimidos Sobres	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua. SOBRES Disolver en 50 ml de agua.	24 horas nevera		Se puede administrar concomitantemente con la NE. Los sobres contienen sorbitol e hidroxipropilcelulosa. Valorar la sustitución por otro AINE para su administración por SE.
ACENOCUMAROL	SINTROM Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	24 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Debido a la gran variabilidad de su biodisponibilidad, la preparación y administración debe realizarse siguiendo siempre los mismos procedimientos. Al triturar el comprimido puede verse alterada su biodisponibilidad por lo que se recomienda controlar más frecuentemente la coagulación.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
ACETAZOLAMIDA	EDEMOX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	7 días nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
ACETILCISTEÍNA	ACETILCISTEÍNA EFG FLUMIL FORTE Comprimidos efervescentes Sobres Solución	COMPRIMIDOS Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia.			Debido a su bajo pH (3,5) se aconseja administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Preparar justo en el momento de la administración.
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	AAS ASPIRINA Comprimidos ASL NORMON INYESPRIN Sobres	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua. SOBRES Disolver en 20 ml de agua.	72 horas nevera	SOBRES Disolver en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE para minimizar los efectos GI. Las especialidades con cubierta entérica deben sustituirse por otra especialidad que pueda triturarse. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
ACICLOVIR	ACICLOVIR EFG ZOVIRAX Comprimidos dispersables Suspensión	COMPRIMIDOS Dispersar en 30 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Dispersar en 30 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. No se recomienda emplear la suspensión debido a su elevada osmolaridad (3000 mOsm/kg) y a su contenido en sorbitol 70%. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
ADEFOVIR	HEPSERA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
ALBENDAZOL	ESKAZOLE Comprimidos recubiertos				El laboratorio fabricante recomienda no triturar esta especialidad.
ALENDRÓNICO	FOSAMAX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 50 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 50 ml de agua.	Debe administrarse una hora antes de la primera toma de NE. Lavar la sonda con 100 ml de agua después de su administración. Principio activo irritante en contacto directo con mucosas.
ALFUZOSINA	BENESTAN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. No emplear las formas retard, sustituir por la forma convencional ajustando la posología.
ALMAGATO	ALMAX Suspensión	SUSPENSIÓN Diluir en 25 ml de agua.			Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Precaución por la posible formación de bezoares.
ALOPURINOL	ALOPURINOL EFG ZYLORIC Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
ALPRAZOLAM	ALPRAZOLAM EFG. TRANKIMAZIN Comprimidos Gotas	GOTAS Diluir en 5 ml de agua.		GOTAS Diluir en 5 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Los comprimidos pueden administrarse vía sublingual, o triturados y disueltos en 10 ml de agua. No emplear las formas retard, sustituir por la forma convencional ajustando la posología. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
AMANTADINA	AMANTADINA LEVEL Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
AMBROXOL	AMBROXOL EFG MUCOSAN MOTOSOL Ampollas Comprimidos Jarabes Sobres	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas	AMPOLLAS Administrar directamente.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Si se emplean los sobres o jarabe considerar que contienen sorbitol.
AMILASA-LIPASA- PROTEASA	KREON PANCREASE Cápsulas			CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de bicarbonato sódico 1 M.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. No se debe triturar los microgránulos pues presentan una cubierta entérica. La liberación de las enzimas tiene lugar a pH mayor o igual a 6.
AMILORIDA- HIDROCLOROTIAZIDA	AMERIDE DIUZINE Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. El principio activo puede ser irritante si no se disuelve bien. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
AMINOCAPROICO ÁCIDO	CAPROFIDES HEMOSTÁTICO CAPROAMIN FIDES Ampollas Solución	AMPOLLAS Administrar directamente.		AMPOLLAS Administrar directamente.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
AMIODARONA	TRANGOREX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia. Cada comprimido contiene 75 mg de yodo. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
AMITRIPTILINA	TRYPTIZOL DEPRELIO Cápsulas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	48 horas nevera Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea desde el Servicio de Farmacia
AMLODIPINO BESILATO	AMLODIPINO EFG ASTUDAL NORVAS Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para minimizar los efectos GI. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
AMOXICILINA TRIHIDRATO	AMOXICILINA EFG CLAMOXYL Cápsulas Sobres	SOBRES Disolver en 20 ml de agua.	48 horas nevera	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para minimizar los efectos GI.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
AMOXICILINA CLAVULÁNICO	AMOXICILINA CLAVULÁNICO EFG AUGMENTINE Comprimidos Sobres Suspensión	SOBRES Disolver en 20 ml de agua.	48 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para minimizar los efectos GI. No emplear las formas retard, sustituir por la forma convencional ajustando la posología.
AMPRENAVIR	AGENERASE Cápsulas Solución	SOLUCIÓN Diluir en 50 ml de agua.		SOLUCIÓN Diluir en 50 ml de agua.	No utilizar las cápsulas. Se puede administrar concomitantemente con la NE. La solución contiene polietilenglicol.
ANASTROZOL	ARIMIDEX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
ARIPIRAZOL	ABILIFY Comprimidos Comprimidos bucodispersables				Utilizar comprimidos bucodispersables.
ASCÓRBICO ÁCIDO	CEBION REDOXON Comprimidos efervescentes Gotas Sobres	SOBRES Disolver en 50 ml de agua.			Se puede administrar concomitantemente con la NE. Se recomienda administrarlo por la mañana. Su absorción es dependiente de la dosis. La biodisponibilidad puede disminuir al 50% con dosis superiores a 1 g.
ATAZANAVIR	REYATAZ Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para incrementar la biodisponibilidad.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
ATENOLOL	ATENOLOL EFG BLOKIUUM, TANSER TENORMIN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. La administración con alimentos disminuye su biodisponibilidad en un 20%. La preparación y administración debe realizarse siguiendo siempre los mismos procedimientos. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
ATORVASTATINA	CARDYL PREVENCOR ZARATOR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Administrar preferentemente por la noche.
AZATIOPRINA	IMUREL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para minimizar los efectos GI. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia. Se recomienda seguir recomendaciones del Servicio de Farmacia para la manipulación de medicamentos citostáticos. Valorar el empleo de la técnica de dispersión del comprimido.
AZITROMICINA	AZITROMICINA EFG ZITROMAX Cápsulas Comprimidos Sobres Suspensión	SOBRES Disolver en 20 ml de agua.		SOBRES Disolver en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para minimizar los efectos GI.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
BACLOFENO	LIORESAL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
BENTAZEPAM	TIADIPONA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
BETAHISTIDINA	FIDIUM SERC Comprimidos Gotas	GOTAS Administrar directamente.		GOTAS Administrar directamente.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
BETAMETASONA					Consultar tabla de equivalencias de corticoides.
BICALUTAMIDA	CASODEX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se recomienda administrar inmediatamente después de NE. Medicamento antiandrógeno, seguir las recomendaciones del Servicio de Farmacia.
BICARBONATO SÓDICO	BICARBONATO Comprimidos Sobres	SOBRES Diluir en 50 ml de agua. COMPRIMIDOS Disolver en 50 ml de agua.			
BIPERIDENO	AKINETON Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	48 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. No emplear las formas retard, sustituir por la forma convencional ajustando la posología.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
BISOPROLOL FUMARATO	BISOPROLOL EFG EMCONCOR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se recomienda administrarlo preferentemente por la mañana antes de la NE. Tiene una biodisponibilidad del 85-90% después de su administración oral. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
BROMHEXINA	BISOLVON Gotas	GOTAS Diluir en 10 ml de agua.		GOTAS Diluir en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
BROMAZEPAM	LEXATIN Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
BROMOCRIPTINA	PARLODEL Cápsulas Comprimidos	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para minimizar los efectos GI. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
BUDESONIDA	ENTOCORD Cápsulas liberación controlada				Alternativa emplear entocord enema.
BUFLOMEDILO	LOFTON Comprimidos Gotas	GOTAS Diluir en 10 ml de agua.		GOTAS Diluir en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. No utilizar los comprimidos, son de cubierta entérica.
BUPRENORFINA	BUPREX SUBUTEX Comprimidos sublinguales				Su biodisponibilidad vía sublingual es baja, un 55%. No se deben pulverizar los comprimidos. Administrar vía sublingual.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
BUSULFAN	BUSULFANO ALLEN Comprimidos				Se puede administrar concomitantemente con la NE. Medicamento citostático, seguir recomendaciones del Servicio de Farmacia.
BUTILESCOPOLAMINA	BUSCAPINA Ampollas Grageas	AMPOLLAS Administrar directamente.		AMPOLLAS Administrar directamente.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Grageas con recubrimiento para enmascarar el olor y sabor desagradable. Alternativa emplear supositorios.
BUTILESCOPOLAMINA METAMIZOL	BUSCAPINA COMPOSITUM Ampollas Grageas	AMPOLLAS Administrar directamente.		AMPOLLAS Administrar directamente.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
CABERGOLINA	DOSTINEX SOGILEN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE.
CALCIO GLUCONATO	CALCIO SANDOZ FORTE Comprimidos efervescentes	COMPRIMIDOS Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia.		COMPRIMIDOS Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración y separadamente del resto de medicación por riesgo de interacciones.
CALCITRIOL	ROCALTROL Ampollas Cápsulas				No se recomienda su administración por esta vía por ser necesario un vehículo oleoso que podría quedar adherido a la sonda, originando una dosificación incorrecta.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
CAPTOPRILO	CAPTOPRIL EFG CAPOTEN CESPLON DILABAR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE. Los alimentos reducen la absorción en un 30-40%. Valorar la preparación de una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
CARBAMAZEPINA	CARBAMAZEPINA EFG TEGRETOL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de mezcla hidroalcohólica.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de mezcla hidroalcohólica.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. La preparación y administración debe realizarse siguiendo siempre los mismos procedimientos. Valorar la preparación de una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
CARBIMAZOL	NEO TOMIZOL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
CARBIMIDA CÁLCICA	COLME Gotas	GOTAS Diluir en 10 ml de agua.	72 horas nevera	GOTAS Diluir en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
CARISOPROLOL	MIO RELAX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de mezcla hidroalcohólica.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de mezcla hidroalcohólica.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para minimizar los efectos GI.
CARVEDILOL	CARVEDILOL EFG COROPRES Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para minimizar la incidencia de hipotensión ortostática.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
CEFADROXILO	DURACEF CEFROXIL Cápsulas Suspensión	SUSPENSIÓN Administrar directamente.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
CEFALEXINA	KEFLORIDINA Cápsulas Sobres	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.			Administrar separadamente de la NE. Valorar la posibilidad de sustituir por cefadroxilo por presentar una mayor biodisponibilidad.
CEFIXIMA	CEFIXIMA EFG DENVAR NECOPEN Cápsulas Sobres Suspensión	SOBRES Disolver en 20 ml de agua.			Por presentar un pH inferior a 3,5 se debe administrar separadamente de la NE, a 1 menos una hora antes o dos horas después de su administración.
CEFUROXIMA- AXETILO	ZINNAT SELAN Comprimidos Sobres Suspensión	SOBRES Disolver en 20 ml de agua.		SOBRES Disolver en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para incrementar su biodisponibilidad.
CETIRIZINA	CETIRIZINA EFG ZYRTEC Comprimidos Gotas Solución	GOTAS Diluir en 10 ml de agua.		GOTAS Diluir en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
CICLOBENZAPRINA	YURELAX Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
CICLOFOSFAMIDA	GENOXAL Grageas				Medicamento citostático, seguir recomendaciones del Servicio de Farmacia.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
CICLOSERINA	CYCLOSERINE Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	Administración inmediata.	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
CICLOSPORINA	SANDIMUN NEORAL Cápsulas Solución	SOLUCIÓN Diluir en 50 ml de agua.	Administración inmediata.		Aunque existen estudios contradictorios sobre la administración con la NE, se recomienda su administración concomitantemente para disminuir la interacción con la sonda.
CINITAPRIDA	BLASTON CIDINE Comprimidos Sobres Solución	SOBRES Disolver en 20 ml de agua.		SOBRES Disolver en 20 ml de agua.	Administrar 15 minutos antes de la NE, por incompatibilidad.
CIPROFLOXACINO				COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se aconseja sustituir por ofloxacino ya que es la quinolona con mayor biodisponibilidad por vía nasointestinal. El resto de quinolonas interactúan con NE disminuyendo su biodisponibilidad.
CIPROHEPTADINA	PERIACTIN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.			Se puede administrar concomitantemente con la NE.
CIPROTERONA ACETATO	ANDROCUR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
CITALOPRAM	CITALOPRAM EFG PRISDAL SEROPRAM Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
CITICOLINA	SOMAZINA Ampollas Gotas	AMPOLLAS Administrar directamente.		AMPOLLAS Administrar Directamente.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
CLARITROMICINA	CLARITROMICINA EFG KLACID BREMON Comprimidos Sobres Suspensión	SOBRES Disolver en 20 ml de agua.	No refrigerar	SOBRES Disolver en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE.
CLEBOPRIDA	CLEBORIL Comprimidos Gotas Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE por incompatibilidad física.
CLINDAMICINA	DALACIN Cápsula	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	No refrigerar	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, aunque se ve disminuida la velocidad de absorción.
CLOBAZAN	NOIAFREN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, aunque se ve disminuida la velocidad de absorción. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
CLODRÓNICO ÁCIDO	BONEFOS Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.			Alternativa considerar la sustitución por un equivalente terapéutico, cuando se precise administración por SE.
CLOMETIAZOL	DISTRANEURINE Cápsulas				No se recomienda su administración por esta vía porque el líquido es oleoso y podría quedar adherido a la sonda, originando una dosificación incorrecta. Sustituir por un equivalente terapéutico con propiedades hipnóticas y sedantes.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
CLOMIPRAMINA	ANAFRANIL Grageas Ampollas	GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		AMPOLLAS Administrar Directamente.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. No utilizar los comprimidos, son de liberación retardada. Sustituir por la forma convencional ajustando la posología.
CLONAZEPAM	RIVOTRIL Comprimidos Gotas	GOTAS Disolver en 10 ml de agua.		GOTAS Disolver en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
CLONIDINA	CATAPRESAN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar la preparación de una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
CLONIXILATO DE LISINA	DOLALGIAL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para minimizar los efectos GI.
CLOPERASTINA	FLUTOX SEKISAN Grageas Jarabe	JARABE Diluir en 20 ml de agua.		JARABE Diluir en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. 3,54 mg de cloperastina fendizoato equivalente a 2 mg de cloperastina clorhidrato.
CLOPIDOGREL	ISCOVER PLAVIX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para minimizar los efectos GI.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
CLORAZEPATO DIPOTÁSICO	TRANXILIUM Cápsulas Comprimidos	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	Administración inmediata.		Se puede administrar concomitantemente con la NE. Se absorbe principalmente en estómago, por el pH ácido, el clorazepato se descarboxila dando lugar a N-desmetildiazepam metabolito que es rápidamente absorbido a este nivel. En presencia de agua se forma dióxido de carbono (inestable en agua).
CLORAMBUCILO	LEUKERAN Comprimidos				Medicamento citostático, seguir recomendaciones del Servicio de Farmacia. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
CLOROQUINA	RESOCHIN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas Nevera Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
CLORPROMAZINA	LARGACTIL Ampollas Comprimidos Gotas	GOTAS Administrar directamente.		AMPOLLAS Administrar directamente.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Presenta incompatibilidad física con los iones de aluminio, magnesio y calcio de la NE.
CLORTALIDONA	HIGROTONA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
CLOTIAPINA	ETUMINA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
CLOTIAZEPAM	DISTENSAN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para aumentar su biodisponibilidad.
CLOXACILINA	ANACLOSIL ORBENIN Cápsulas Jarabe	JARABE Administrar directamente.	72 horas nevera	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
CLOZAPINA	LEPONEX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
CODEÍNA	CODEISÁN Comprimidos Jarabe	JARABE Administrar directamente.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para minimizar los efectos GI. Las soluciones contienen sorbitol.
COLESTIRAMINA	RESINCOLESTIRAMINA Sobres	SOBRES Disolver en 150 ml de agua.			Administrar al menos 20 minutos antes de la NE. Puede interferir en la absorción de otros medicamentos por lo que debe administrarse separadamente de estos.
COTRIMOXAZOL	SEPTRIM FORTE GOBENSTRIM Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN Diluir en 50 ml de agua.	48 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
DANAZOL	DANATROL Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para aumentar su biodisponibilidad.
DAPSONA	SULFONA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de mezcla hidroalcohólica.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10ml de mezcla hidroalcohólica.	No existen estudios de administración con la NE.
DEFLAZACORT	DEZACORT ZAMENE Comprimidos Gotas	GOTAS Diluir en 10 ml de agua.		GOTAS Diluir en 10 ml de Agua.	Administrar concomitantemente con la NE.
DEXAMETASONA FOSFATO	DEXAMETASONA EFG FORTECORTIN Ampollas Comprimidos	AMPOLLAS Administrar directamente.		AMPOLLAS Administrar directamente.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
DEXCLORFENIRAMIN A MALEATO	POLARAMINE Ampollas Comprimidos Jarabe	JARABE Administrar directamente.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua. AMPOLLAS Administrar directamente.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para minimizar los efectos GI. El jarabe contiene sorbitol. No emplear la forma repetabs, e de liberación retardada, sustituir por la forma convencional, ajustando la posología.
DEXKETOPROFENO	ENAMTIUM Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE.
DEXTROMETORFANO	ROMILAR Gotas Jarabe	GOTAS Administrar directamente.		GOTAS Administrar directamente.	Administrar concomitantemente con la NE. Alternativa romilar jarabe pero considerando que contiene 650 mg/5 ml de sorbitol. Para su administración debería diluirse en 25 ml de agua.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
DIAZEPAM	DIAZEPAM EFG Comprimidos Gotas	GOTAS Administrar directamente.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para aumentar su biodisponibilidad. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
DICLOFENACO	DICLOFENAC EFG VOLTAREN Comprimidos				No pulverizar porque tienen cubierta entérica. Se recomienda su sustitución por otros AINES como Ibuprofeno.
DIDANOSINA	VIDEX Cápsulas Comprimidos masticables/ Dispersables Polvo	COMPRIMIDOS Dispersar dos comprimidos en 50 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Dispersar dos comprimidos en 50 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Los alimentos disminuyen su biodisponibilidad en un 50%. No utilizar las cápsulas (son gastrorresistentes) ni el polvo (se prepara con Alugel).
DIFENHIDRAMINA	BENADRYL Cápsulas Solución	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para minimizar los efectos GI.
DIGOXINA	DIGOXINA BOEHRINGER LANACORDIN Ampollas Comprimidos Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente. COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	AMPOLLAS Administrar directamente.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, excepto con NE con fibra que debe administrarse separadamente.
DILTIAZEM	DINISOR MASDIL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. No emplear las formas retard, sustituir por la forma convencional ajustando la posología. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
DIPIRIDAMOL	PERSANTIN Grageas	GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para minimizar los efectos GI. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
DISULFIRANO	ANTABUS Comprimido	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
DOMPERIDONA	MOTILIAM DOMPERIDONA Comprimidos Jarabe	JARABE Administrar directamente.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Por sus propiedades farmacológicas se recomienda su administración 15 minutos antes de la NE. El jarabe contiene sorbitol.
DONEPEZILO	ARICEPT Comprimidos recubiertos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Se aconseja su administración en la última toma de la noche. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
DOXAZOSINA	DOXAZOSINA EFG CARDURAN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. No emplear las formas neo, de liberación controlada, sustituir por la forma convencional ajustando la posología.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
DOXICICLINA	VIBRACINA Cápsulas Suspensión	SUSPENSIÓN Administrar directamente. CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Doxiciclina se absorbe en la parte superior del intestino delgado. La suspensión contiene sorbitol.
DULOXETINA	CYMBALTA XERISTAR Cápsulas gastroresistentes	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de solución 1 M de bicarbonato sódico.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 10 ml de solución 1 M de bicarbonato sódico.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Para administración oral el fabricante aconseja tragar la cápsula entera, evitando su trituración o masticación.
EFAVIRENZ	SUSTIVA Cápsulas Comprimidos	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua. COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua. COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Los alimentos grasos aumentan su absorción en un 50% (se puede mezclar con 10 ml de aceite MCT).
EMTRICITABINA	EMTRIVA Cápsulas Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.		CÁPSULA Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. La biodisponibilidad de la solución oral se reduce a un 80%, una cápsula de 200 mg es equivalente a 240 mg (24 ml) de la solución oral. La solución contiene propilenglicol y xilitol.
EMTRICITABINA TENOFIVIR	TRUVADA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para aumentar la absorción de tenofovir.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
ENALAPRILLO	ENALAPRIL EFG RENITEC Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
ENTACAPONA	COMTAN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
ERITROMICINA	PANTOMICINA Comprimidos Sobres Suspensión	SOBRES Disolver en 50 ml de agua.		SOBRES Disolver en 50 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
ESOMEPRAZOL	AXIAGO NEXIUM MUPS Comprimidos gastroresistentes				Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
ESPIRAMICINA	ROVAMYCINE Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
ESPIRONOLACTONA	ALDACTONE Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para aumentar su biodisponibilidad y disminuir su toxicidad GI. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
ESPIRONOLACTONA ALTIZIDA	ALDACTACINE Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
ESTAVUDINA	ZERIT Cápsulas Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.	nevera	SOLUCIÓN Administrar directamente.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Con alimentos disminuye su biodisponibilidad en un 45%.
ESTREPTOQUINASA ESTREPTODORNASA	VARIDASA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
ETAMBUTOL	MYAMBUTOL Grageas	GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para minimizar los efectos GI.
ETOPÓSIDO	VEPESID Cápsulas				Medicamento citostático, seguir recomendaciones del Servicio de Farmacia.
FAMCICLOVIR	FAMVIR, FAMCICLOVIR VISFARM Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
FAMOTIDINA	FAMOTIDINA EFG TAMIN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
FELODIPINO					Comprimidos de liberación sostenida. Sustituir por equivalente terapéutico.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
FENITOINA	NEOSIDANTOINA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se aconseja administrar los comprimidos triturados, se obtienen mayores niveles plasmáticos que cuando se administran cápsulas. Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
FENOBARBITAL	LUMINALETAS LUMINAL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	48 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Debe realizarse la preparación y administración siguiendo siempre los mismos procedimientos. No se aconseja la utilización de ampollas y gotas por vía SE por su contenido en glicoles. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
FENOXIBENZAMINA	DIBENYLIN Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
FINASTERIDE	PROSCAR EUCOPROST Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
FITOMENADIONA	KONAKION Ampollas	AMPOLLAS Administrar directamente.	72 horas nevera Proteger de la luz	AMPOLLAS Diluir en 5 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
FLECAINIDA	APOCARD Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
FLUCITOSINA	ANCOTIL Cápsulas Comprimidos	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
FLUCONAZOL	FLUCONAZOL EFG DIFLUCAN LOITIN Cápsulas Suspensión	SUSPENSIÓN Administrar directamente.	72 horas nevera	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
FLUDROCORTISONA	ASTONIN MERCK Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
FLUNARIZINA	FLURPAX SIBELIUM Cápsulas Comprimidos	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
FLUNITRAZEPAM	ROHIPNOL Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	48 horas nevera	AMPOLLAS Diluir en 5 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
FLUOXETINA	FLUOXETINA EFG ADOFEN PROZAC Cápsulas Comprimidos dispersables Solución	SOLUCIÓN Diluir en 20 ml de agua. COMPRIMIDOS Dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
FLURAZEPAM	DORMODOR Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar antes de la última toma nocturna de la NE.
FLUTAMIDA	EULEXIN PROSTACUR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE.
FÓLICO, ÁCIDO	ÁCIDO FÓLICO EFG ACFOL Cápsulas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administración inmediata	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
FOLINATO CÁLCICO	LEDERFOLIN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administración inmediata	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
FOSAMPRENAVIR	TELZIR Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN Diluir en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 30 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
FOSFOMICINA	FOSFOCINA Cápsulas Sobres Suspensión	SUSPENSIÓN Administrar directamente. CÁPSULA Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
FUROSEMIDA	FUROSEMIDA EFG SEGURIL Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	AMPOLLAS Diluir en 5 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para minimizar los efectos GI. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
GABAPENTINA	NEURONTIN GABAPENTINA EFG Cápsulas Comprimidos	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	72 horas nevera	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
GALANTAMINA	REMINYL Comprimidos Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.		SOLUCIÓN Administrar directamente.	Administrar concomitantemente con la NE.
GEMFIBROCILO	LOPID TRIALMIN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar una hora antes de NE.
GLIBENCLAMIDA	DAONIL EUGLUCON Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar antes de iniciar la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
GLICLAZIDA	DIAMICRON Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
GLIMEPARIDA	AMARYL RONAME Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la primera toma de NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
GLIPICIDA	MINODIAB Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar antes de iniciar la NE.
GLIQUIDONA	GLURENOR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
GRANISETRON	KYTRIL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
HALAZEPAM	ALAPRYL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
HALOPERIDOL	HALOPERIDOL Comprimidos Gotas	GOTAS Administrar directamente.		GOTAS Diluir en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración (pH ácido).
HIDRALAZINA	HYDRAPRES Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Debido a la variabilidad de su biodisponibilidad, se recomienda monitorizar la presión arterial.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
HIDRALAZINA (continuación)					<p>Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.</p> <p>Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.</p>
HIDROCLOROTIAZIDA	HIDROSALURETIL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	<p>Se puede administrar concomitantemente con la NE.</p> <p>Absorción limitada al duodeno y parte proximal del yeyuno.</p> <p>Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.</p> <p>Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.</p>
HIDROCORTISONA	HIDROALTESONA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	<p>Administrar concomitantemente con la NE.</p> <p>Si se administra una dosis única debe hacerse por la mañana para evitar que el eje hipotálamo-hipofisario sea inhibido.</p> <p>Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.</p>
HIDROXIZINA	ATARAX Comprimidos Jarabe	JARABE Administrar directamente.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
HIERRO	GLUTAFERRO 1 ml = 30 mg Fe CROMATONBIC FERRO 1 vial = 37,5 mg	GOTAS Administrar directamente.		VIAL Administrar directamente.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración, para aumentar la absorción de Fe. Si se desea disminuir los efectos GI, puede administrarse concomitantemente con la NE.
IBANDRONATO	BONDRONAT Comprimidos recubiertos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 50 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 50 ml de agua.	Debe administrarse una hora antes de la primera toma de NE. Lavar la sonda con 100 ml de agua después de su administración. Principio activo irritante en contacto directo con mucosas.
IBUPROFENO	IBUPROFENO EFG ESPEDIFEN GELOFENO DALSY Comprimidos Sobres Suspensión	SUSPENSIÓN Administrar directamente.		SOBRES Disolver en 50 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para minimizar los efectos GI.
IMIPRAMINA	TOFRANIL Grageas TOFRANIL PAMOATO Cápsulas	GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE excepto con la NE con fibra que debe administrarse separadamente.
INDINAVIR	CRIXIVAN Cápsulas duras	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. La NE con alto porcentaje en hidratos de carbono, proteínas y grasas puede disminuir su absorción entre un 50-70% Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
INDOMETAZINA	INACID REUSIN Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
ISONIAZIDA- PIRAZINAMIDA- RIFAMPICINA	RIFATER Grageas	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
ISONIAZIDA- PIRIDOXINA	CEMIDON 150 B6 Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
ISONIAZIDA- RIFAMPICINA	RIFINAH Grageas	GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
ISOSORBIDA DINITRAT	ISO LACER Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
ISOSORBIDA MONONITRATO	CORONUR UNIKET Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
ITRACONAZOL	CANADIOL SPORANOX Cápsulas Solución	SUSPENSIÓN Administrar directamente.			Administrar concomitantemente con la NE por mayor biodisponibilidad. La biodisponibilidad de la suspensión es superior a la del comprimido.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
ITRACONAZOL (continuación)					No administrar conjuntamente con medicamentos que disminuyan la secreción gástrica o espaciar la administración 2 h. Su absorción se ve favorecida en medio ácido.
KETOCONAZOL	KETOCONANOL EFG FUNGAREST PANFUNGOL Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN Administrar directamente.			Administrar concomitantemente con la NE por mayor biodisponibilidad. No administrar conjuntamente con medicamentos que disminuyan la secreción gástrica o espaciar la administración 2 h. Su absorción se ve favorecida en medio ácido.
KETOPROFENO	KETOPROFENO EFG Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. No utilizar Orudis, son comprimidos de cubierta entérica.
KETOROLACO	DROAL TORADOL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	48 horas nevera Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE.
KETOTIFENO	ZASTEN Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.		SOLUCIÓN Administrar directamente.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
LABETALOL	TRANDATE Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	AMPOLLAS Administrar directamente. COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
LACTITOL	EMPORTAL OPONAF	SOBRES Diluir en 25 ml de agua.			Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
LACTULOSA					Sustituir por lactitol sobres.
LAMIVUDINA	EPIVIR Comprimidos Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con NE.
LAMIVUDINA- ZIDOVUDINA	COMBIVIR Comprimidos recubiertos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
LAMOTRIGNINA	LABILENO LAMICTAL Comprimidos dispersables	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
LEVETIRACETAM	KEPPRA Comprimidos recubiertos Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con NE.
LEVODOPA- CARBIDOPA	SINEMET Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Levodopa compite con ciertos aminoácidos en el transporte intestinal. No administrar conjuntamente con dietas hiperproteicas. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
LEVODOPA- BENSERAZIDA	MADOPAR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Levodopa compete con ciertos aminoácidos en el transporte intestinal. No administrar conjuntamente con dietas hiperproteicas.
LEVOFLOXACINO	TAVANIC Comprimidos recubiertos				Se aconseja sustituir por ofloxacino ya que es la quinolona con mayor biodisponibilidad por vía nasointestinal. El resto de quinolonas interactúan con NE disminuyendo su biodisponibilidad.
LEVOMEPRIMAZINA	SINOGAN Comprimidos Gotas	GOTAS Administrar directamente.		GOTAS Administrar directamente.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
LEVOTIROXINA	LEVOTHROID TIROXINA LEO Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. No administrar con NE-fibra, su absorción se ve influenciada por la fibra. Absorción variable en intestino delgado.
LINEZOLID	ZYVOXID Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administración inmediata	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con NE.
LIOTIRONINA	TRIYODOTIRONINA LEO Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. No administrar con NE-fibra, su absorción se ve influenciada por este nutriente. Absorción variable en intestino delgado.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
LISINOPRILO	DONEKA ZESTRIL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
LISURIDA	DOPERGIN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
LITIO CARBONATO	PLENUR Comprimidos de liberación sostenida				Administrar concomitantemente con NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
LOPERAMIDA	FORTASEC PROTECTOR Cápsulas Comprimidos	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	72 horas nevera	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
LOPINAVIR- RITONAVIR	KALETRA Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.		SOLUCIÓN Diluir en 20 ml de agua.	Administrar conjuntamente con NE. No utilizar las cápsulas.
LOPRAZOLAM	SOMNOVIT Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar antes de la toma nocturna de NE
LORATADINA	CLARYTINE Comprimidos Jarabe	JARABE Administrar directamente.	48 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar antes de iniciar la NE.
LORAZEPAM	IDALPREM ORFIDAL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar antes de iniciar la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
LORMETAZEPAM	LORAMET NOCTAMID Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar antes de iniciar la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
LOSARTAN	COZAAR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
LOVASTATINA	LOVASTATINA EFG MEVACOR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE exceptuando dietas con fibra por presentar interacciones con este nutriente.
MAPROTILINA	LUDIOMIL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
MEBENDAZOL	LOMPER Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN Administrar directamente.		SUSPENSIÓN Administrar directamente.	Administrar concomitantemente con la NE.
MEFLOQUINA	LARIAM Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administración inmediata	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE.
MEGESTROL ACETATO	BOREA MEGEFREN MAYGACE Comprimidos Sobres	SOBRES Diluir en 25 ml de agua.		SOBRES Diluir en 50 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
MELFALAN	MELFALAN WELLCOME Comprimidos				Medicamento citostático, seguir recomendaciones del Servicio de Farmacia.
MELOXICAM	MOVALIS Comprimidos				Alternativa posibilidad de sustitución por piroxicam u otro AINE.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
MERCAPTOPURINA	MERCAPTOPURINA WELLCOME Comprimidos		72 horas nevera		Se debe administrar en ayunas (la NE disminuye su absorción) y con abundantes líquidos para evitar su toxicidad renal. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia. Medicamento citostático, seguir recomendaciones del Servicio de Farmacia.
MESALAZINA	CLAVERSAL LIXACOL				No se pueden triturar, son comprimidos de cubierta entérica, cuyo principio activo es liberado a nivel de colon. Alternativa emplear la espuma rectal o los enemas.
MESNA	UROMITEXAN Ampollas	AMPOLLAS Diluir en 20 ml de agua.	24 horas nevera	AMPOLLAS Diluir en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
METADONA	METASEDIN Ampollas Comprimidos	SOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA Administrar directamente.	72 horas nevera Proteger de la luz	AMPOLLAS Administrar directamente.	Administrar concomitantemente con la NE. Utilizar la fórmula magistral extemporánea elaborada por el Servicio de Farmacia.
METAMIZOL MAGNÉSICO	METAMIZOL EFG NOLOTIL Ampollas Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		AMPOLLAS Diluir en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE.
METFORMINA	DIANBEN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrarse concomitantemente con la NE. Mecanismo de absorción según un proceso saturable activo.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
METILDIGOXINA	LANIRAPID Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE exceptuando dietas con fibra por presentar interacciones con este nutriente. Alternativa vía SE pueden emplearse la ampollas. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
METILDOPA	ALDOMET Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
METILPREDNISOLONA	URBASON Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
METOCARBAMOL	ROBAXIN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE.
METOCLOPRAMIDA	PRIMPERAN Jarabe	JARABE Diluir en 20 ml de agua.		JARABE Diluir en 20 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
METOPROLOL	BELOKEN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrarse concomitantemente con la NE. No emplear las formas retard, sustituir por la forma convencional ajustando la posología. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
METOTREXATO	METOTREXATO Comprimidos				Administrar separadamente de la NE, los alimentos disminuyen su absorción. Medicamento citostático, seguir recomendaciones del Servicio de Farmacia.
METRONIDAZOL	FLAGYL Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN Administrar directamente.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. La suspensión contiene 200 mg/5 ml de benzoato de metronidazol equivalentes a 125 mg/ 5 ml de metronidazol (500 mg de metronidazol = 20 ml de suspensión).
MEXILETINA	MEXITIL Ampollas Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	72 horas nevera	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
MIANSERINA	LANTANON Comprimidos recubiertos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
MICOFENOLATO	CELLCEPT Cápsulas Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN Administrar directamente.	72 horas nevera	SUSPENSIÓN Diluir con 50 ml de agua.	Administrar veinte minutos antes de iniciar la NE. La suspensión contiene sorbitol. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia. Efecto teratogénico, seguir recomendaciones del Servicio de Farmacia.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
MIDAZOLAM	DORMICUM Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua. AMPOLLAS Diluir con 5 ml de agua.		AMPOLLAS Diluir con 5 ml de agua.	Administrar antes de iniciar la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
MIRTAZEPINA	REXER FLASH Comprimidos Gotas	GOTAS Administrar directamente.		GOTAS Administrar directamente.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Pueden emplearse comprimidos bucodispersables.
MISOPROSTOL	CYTOTEC Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
MORFINA SULFATO	SKENAM Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar los microgránulos en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar los microgránulos en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE No triturar los microgránulos, son de cubierta entérica.
NADOLOL	SOLGOL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio Farmacia.
NALTREXONA	ANTAXONE CELUPAN Cápsulas Comprimidos	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio Farmacia.
NAPROXENO	NAPROXYN Sobres	SOBRES Disolver en 50 ml de agua.		SOBRES Disolver en 50 ml de agua.	Administrar concomitantemente con NE.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
NELFINAVIR	VIRACEPT Comprimidos Polvo	POLVO Mezclar los gramos de polvo calculados con agua o NE.	6 horas	POLVO Mezclar los gramos de polvo calculados con agua o NE.	Administrar concomitantemente con NE.
NEOMICINA	NEOMICINA SALVAT Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar veinte minutos antes de iniciar la NE.
NEVIRAPINA	VIRAMUNE Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN Administrar directamente.		SUSPENSIÓN Diluir en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. La suspensión contiene sorbitol.
NICARDIPINO	NERDIPINA VASONASE Cápsulas Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
NIFEDIPINO	ADALAT Cápsulas sublinguales				Se aconseja administrar Adalat sublingual o valorar la posibilidad de sustitución por otro antagonista de Calcio. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio Farmacia.
NIMODIPINO	NIMOTOP Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de mezcla hidroalcohólica (3:1).	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de mezcla hidroalcohólica (3:1).	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
NISOLDIPINO	SYSCOR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
NISTATINA	MYCOSTATIN	SUSPENSIÓN Diluir en 20 ml de agua.		SUSPENSIÓN Diluir en 50 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
NITRENDIPINO	BAYPRESOL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
NITROFURANTOINA	FURANTOINA Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN Diluir en 30 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar antes de iniciar la toma de NE, los alimentos disminuyen su absorción. La suspensión contiene sorbitol.
NITROGLICERINA	VERNIES Comprimidos				Administración sublingual.
NORFLOXACINO	NORFLOXACINO EFG NOROXIN				Se aconseja sustituir por ofloxacino ya que es la quinolona con mayor biodisponibilidad por vía nasointestinal. El resto de quinolonas interactúan con NE disminuyendo su biodisponibilidad.
OFLOXACINO	SURNOX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Quinolona de elección para administración por SE. Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
OLANZAPINA	ZYPREXA Comprimidos Comprimidos velotabs				Utilizar comprimidos bucodispersables. Se puede administrar concomitantemente con la NE.
OMEPRAZOL	OMEPRAZOL EFG LOSEC Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar los microgránulos en 10 ml	72 horas nevera	CÁPSULAS Abrir y dispersar los microgránulos en 10 ml	Existe la posibilidad de emplear formulación comercial de microgránulos (Nexium), pero no soluciona los problemas de obstrucción de la sonda.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
OMEPRAZOL (continuación)		de solución 1 M de bicarbonato sódico.	Proteger de la luz	de solución 1 M de bicarbonato sódico.	Alternativa posibilidad de sustituir por ranitidina. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
ONDASETRON	YATROX ZOFRAN ZYDIS Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		AMPOLLAS Administrar directamente.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de utilizar la forma farmacéutica liotabs (Zydis). Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
OTILONIO BROMURO	SPASMOCTYL Grageas	GRAGEA Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		GRAGEA Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar media hora antes de NE. Alternativa utilizar forma farmacéutica supositorios
OXCARBAZEPINA	TRILEPTAL Comprimidos Suspensión	SUSPENSIÓN Administrar directamente.		SUSPENSIÓN Diluir en 30 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
OXIBUTININA	DITROPAN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
PARACETAMOL	PARACETAMOL EFG TERMALGIN GELOCATIL APIRETAL Comprimidos Gotas Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente. GOTAS Administrar directamente.		SOLUCIÓN Diluir en 30 ml de agua. GOTAS Diluir en 30 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
PARACETAMOL CODEÍNA	TERMALGIN CODEÍNA COD EFFERALGAN Cápsulas Comprimidos efervescentes	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Posibilidad de utilizar comprimidos efervescentes; disolver en agua y agitar hasta eliminar efervescencia. Se puede administrar concomitantemente con NE
PAROMOMICINA	HUMATIN Solución	SOLUCIÓN Diluir en 20 ml de agua.		SOLUCIÓN Diluir en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
PAROXETINA	FROSINOR SEROXAT MOTIVAN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE.
PENICILAMINA	CUPRIPEN Cápsulas Comprimidos	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
PENTOXIFILINA	ELORGAN HEMOVAS Ampollas	AMPOLLAS Administrar directamente.		AMPOLLAS Administrar directamente.	Administrar concomitantemente con la NE. No administrar los comprimidos vía SNG, son de cubierta entérica.
PERFENAZINA	DECENTAN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de mezcla hidroalcohólica (3:1).		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de mezcla hidroalcohólica (3:1).	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
PERGOLIDA	PHARKEN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
PERICIAZINA	NEMACTIL Gotas	GOTAS Administrar directamente.		GOTAS Administrar directamente.	Administrar veinte minutos antes de iniciar la NE.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
PIMOZIDA	ORAP Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
PIPEMÍDICO ÁCIDO	NURIL Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar conjuntamente con la NE.
PIRACETAM	CICLOFALINA NOOTROPIL Ampollas Sobres	AMPOLLAS Administrar directamente. SOBRES Disolver en 50 ml de agua.		SOBRES Disolver en 50 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
PIRAZINAMIDA	PIRAZINAMIDA PRODES Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
PIRIDOSTIGMINA BROMURO	MESTINON Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
PIRIDOXINA	BENADON CONDUCTASA Ampollas Comprimidos Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente. COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		SOLUCIÓN Administrar directamente. COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
PIRIMETAMINA	DARAPRIM Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
PIROXICAM	FELDENE FELDENE FLAS Cápsulas Comprimidos dispersables Comprimidos liobtabs	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. Posibilidad de utilizar otros AINES o administrar comprimidos liobtabs.
POTASIO	BOI-K Comprimidos efervescentes	COMPRIMIDOS Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia.		COMPRIMIDOS Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
PRAVASTATINA	LIPEMOL LIPLAT BRISTACOL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Se recomienda administrar en la última toma de NE.
PREDNISOLONA	ESTILSONA Gotas	GOTAS Administrar directamente.		GOTAS Administrar directamente.	Administrar concomitantemente con la NE. Las gotas de estilsona son una suspensión, por lo que deben agitarse antes de su administración. Un ml de estilsona gotas contienen 6,6 mg de prednisolona.
PREDNISONA	DACORTIN PREDNISONA ALONGA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
PRYMIDONA	MYSOLINE Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
PROCAINAMIDA	BIOCORYL Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	72 horas nevera Proteger de la luz	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Para lograr una absorción constante, la preparación y administración debe realizarse siguiendo siempre los mismos procedimientos. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
PROCARBAZINA	NATULAN Cápsulas 50 mg				Medicamento citostático, seguir recomendaciones del Servicio de Farmacia.
PROPAFENONA	RYTMONOR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Para lograr una absorción constante, la preparación y administración debe realizarse siguiendo siempre los mismos procedimientos.
PROPILTIOURACILO					Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
PROPRANOLOL	SUMIAL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea (con pH ácido para mayor estabilidad) por el Servicio de Farmacia.
PROTIONAMIDA	PETEHA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de mezcla hidroalcohólica.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de mezcla hidroalcohólica.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
QUETIAPINA	SEROQUEL Comprimidos recubiertos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
QUINAPRILO	ACUPREL LIDALTRIN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Puede causar incremento de los niveles séricos de potasio. Los comprimidos presentan un alto contenido de Magnesio. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
RAMIPRILO	ACOVIL CARASEL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	48 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
RANITIDINA	ALQUEN ZANTAC Comprimidos efervescentes Comprimidos	COMPRIMIDOS Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia.		COMPRIMIDOS Disolver en 20 ml de agua y agitar hasta finalizar la efervescencia.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
RIBAVIRINA	REBETOL COPEGUS Cápsulas duras Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.	24 horas nevera	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para aumentar su biodisponibilidad.
RIFABUTINA	ANSATIPIN Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
RIFAMPICINA	RIFALDIN RIMACTAN Cápsulas Suspensión	SUSPENSIÓN EXTEMPORÁNEA	4 semanas nevera Proteger de la luz	SUSPENSIÓN EXTEMPORÁNEA	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
RILUZOL	RILUTEK Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración...
RISEDRONATO	ACTONEL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 50 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 50 ml de agua.	Debe administrarse una hora antes de la primera toma de NE. Lavar la sonda con 100 ml de agua después de su administración. Principio activo irritante en contacto directo con mucosas.
RISPERIDONA	RISPERDAL Comprimidos Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.		SOLUCIÓN Administrar directamente.	Administrar concomitantemente con la NE.
RITONAVIR	NORVIR Cápsulas Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.		CÁPSULAS Extraer el contenido de la cápsula y diluir con 10 ml de mezcla hidroalcohólica.	Administrar concomitantemente con la NE. La solución contiene propilenglicol 0,26 ml/ml.
ROPINIROL	REQUIP Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para minimizar los efectos GI.
SAQUINAVIR	INVIRASE Cápsulas	CÁPSULAS Abrir la cápsula y dispersar el contenido en 10 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir la cápsula y dispersar el contenido en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. Su absorción mejora cuando se administra con dietas hipercalóricas.
SELEGILINA	PLURIMEN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar preferentemente por la mañana concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
SERTRALINA	AREMIS BESITRAN Comprimidos Gotas	GOTAS Administrar directamente.		GOTAS Diluir en 10 ml de mezcla hidroalcohólica.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
SIMVASTATINA	SIMVASTATINA EFG ZOCOR COLEMIN PANTOK Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de mezcla hidroalcohólica.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de mezcla hidroalcohólica.	Administrar preferentemente con la última toma de NE.
SIROLIMUS	RAPAMUNE Cápsulas Solución	SOLUCIÓN Diluir en 50 ml de agua.		SOLUCIÓN Diluir en 50 ml de agua.	Después de cada administración lavar la sonda con al menos 50 ml de agua. Debido a la gran variabilidad de su biodisponibilidad, la preparación y administración debe realizarse siguiendo siempre los mismos procesos. Dosis iguales o inferiores a 2 mg (cápsulas o solución) se consideran terapéuticamente equivalentes. Dosis superiores no son bioequivalentes.
SOTALOL	SOTAPOR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	72 horas nevera	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con NE Seguir siempre el mismo horario de administración. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
SUCRALFATO					Se recomienda sustituir por un anti H2 por riesgo de formación de bezoares si se administra con NE.
SULFADIAZINA	SULFADIAZINA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Administrar abundantes líquidos durante el tratamiento para reducir el riesgo de cristaluria.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
SULFASALAZINA	SALAZOPYRINA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de bicarbonato 1 M.	Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de bicarbonato 1 M.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
SULPIRIDA	DOGMATIL Comprimidos Solución	SOLUCIÓN Diluir en 50 ml de agua.		SOLUCIÓN Diluir en 50 ml de agua.	Administrar preferentemente antes de iniciar la NE.
SUMATRIPTAN	IMIGRAN Comprimidos				Se puede administrar concomitantemente con la NE. Se recomienda sustituir por rizatriptán o zolmitriptán presentación sublingual.
TACROLIMUS	PROGRAF Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar preferentemente antes de iniciar la NE. Debido a la gran variabilidad de su biodisponibilidad, la preparación y administración debe realizarse siguiendo siempre los mismos procesos. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
TAMOXIFENO	TAMOXIFENO EFG NOLVADEX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
TEGAFUR	UTEFOS Cápsulas				Medicamento citostático, seguir las recomendaciones del Servicio de Farmacia.
TEGAFUR-URACILO	UFT Sobres				Medicamento citostático, seguir las recomendaciones del Servicio de Farmacia

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
TEMOZOLOMIDA	TEMODAL Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de solución extemporánea de pH ácido.			Medicamento citostático, seguir las recomendaciones del Servicio de Farmacia. Puede utilizarse como solución extemporánea la solución elaborada por el Servicio de Farmacia. Para minimizar las náuseas y vómitos se aconseja administrar preferentemente media hora antes de la última toma de la noche. Principio activo irritante en contacto directo con mucosas.
TENOFOVIR	VIREAD Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitante con la NE.
TEOFILINA	ELIXIFILIN TEOLIXIR Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.		SOLUCIÓN Diluir en 20 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
TERAZOSINA	MAGNUROL ZAYASEL Comprimidos Solución	SOLUCIÓN Diluir en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. No se modifica la biodisponibilidad, únicamente se produce un retraso en la velocidad de absorción. La solución contiene sorbitol.
TERBINAFINA	LAMISIL Comprimidos				Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
TETRAZEPAM	MYOLASTAN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
TIAGABINA	GABITRIL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
TIAMAZOL	TIRODRIL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
TIAMINA	BENERVA Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Pueden emplearse las ampollas de 100 mg/ml.
TIAPRIDA	TIAPRIZAL Ampollas Comprimidos Gotas	GOTAS Administrar directamente.		GOTAS Administrar directamente. AMPOLLAS Administrar directamente.	Se puede administrar concomitantemente con la NE Los alimentos aumentan su biodisponibilidad en un 20%, la preparación y administración debe realizarse siguiendo siempre los mismos procesos. Pueden emplearse las ampollas de 100 mg/2 ml
TICLOPIDINA	TICLODONE TIKLID Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Proteger de la luz	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para minimizar los efectos adversos GI (ocurre en el 12,5% de los pacientes).
TIETILPERAZINA	TORECAN Grageas	GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Como alternativa pueden emplearse los supositorios o valorar la sustitución por otra fenotiazida en solución.
TIOGUANINA	TIOGUANINA				Medicamento citostático, seguir las recomendaciones del Servicio de Farmacia. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula extemporánea por el Servicio de Farmacia.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
TOLTERODINA	DETRUSITOL UROTROL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE, para disminuir los efectos adversos GI. No utilizar las fórmulas Neo (son de liberación retardada), sustituir por la forma convencional ajustando la posología.
TORASEMIDA	DILUTOL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
TRAMADOL	ADOLONTA Cápsulas Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.		SOLUCIÓN Administrar directamente.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
TRANEXÁMICO, ÁCIDO	AMCHAFIBRIN	AMPOLLAS Administrar directamente.		AMPOLLAS Diluir en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
TRAZODONA	DEPRAX Ampollas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		AMPOLLAS Administrar directamente. COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para minimizar los efectos adversos.
TRIFLUOPERAZINA	ESKAZINE Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE al menos, una hora antes o dos horas después de su administración.
TRIFLUSAL	DISGREN Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE para minimizar los efectos adversos.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
TRIHEXIFENIDILO	ARTANE Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.
TRIMETAZIDINA	IDAPTAN Solución	SOLUCIÓN Diluir en 30 ml de agua.		SOLUCIÓN Diluir en 30 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE.
TROSPPIO, CLORURO	URAPLEX Grageas	GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.		GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
URSODESOXICÓLICO	URSOLITE URSOCHOL Cápsulas Comprimidos	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	72 h Nevera Proteger de la luz	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
VALPROICO ÁCIDO	DEPAKINE Comprimidos Solución	SOLUCIÓN Administrar directamente.		SOLUCIÓN Administrar directamente.	Administrar concomitantemente con la NE. No utilizar las fórmulas Crono (son de liberación retardada), sustituir por la forma convencional ajustando la posología.
VALPROMIDA	DEPAMIDE Grageas			GRAGEAS Pulverizar y dispersar en 20 ml de agua.	No se pueden emplear las grageas para su administración por SNG pues presentan cubierta entérica. Administrar concomitantemente con la NE.
VENLAFAXINA	DOBUPAL VANDRAL Cápsulas Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar 20 ml de agua.	Administrar concomitantemente con la NE. No utilizar las fórmulas de liberación retardada, sustituir por la forma convencional ajustando la posología.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
VERAPAMILO	MANIDON Grageas	GRAGEAS Pulverizar y dispersar 20 ml de agua.	24horas Nevera Proteger de la luz	GRAGEAS Pulverizar y dispersar 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE. Valorar la posibilidad de elaborar una fórmula magistral extemporánea por el Servicio de Farmacia.
VIGABATRINA	SABRILEX Sobres	SOBRES Disolver en 20 ml de agua.		SOBRES Disolver en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
VITAMINA B COMPLEJO	HIDROXIL BENEXOL Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
VORICONAZOL	VFEND Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar 20 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE al menos una hora antes o dos horas después de su administración.
WARFARINA	ALDOCUMAR Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar 10 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE al menos, una hora antes o dos horas después de su administración. Absorción limitada al duodeno, lo que permite su utilización en paciente con síndrome del intestino corto. Como alternativa se pueden emplear heparinas de bajo peso molecular en pacientes con yeyunostomía.
ZALCITABINA	HIVID Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar 20 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar 20 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE al menos, una hora antes o dos horas después de su administración. Valorar el empleo de la técnica de dispersión de comprimidos.

<i>Principio activo</i>	<i>Nombre comercial</i>	<i>SNG, SG FF aconsejada</i>	<i>Estabilidad</i>	<i>SE, SY FF aconsejada</i>	<i>Observaciones</i>
ZIDOVUDINA	RETROVIR Cápsulas Solución	SOLUCIÓN Diluir en 30 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Administrar separadamente de la NE, al menos una hora antes o dos horas después de su administración. La solución contiene sorbitol y presenta una elevada osmolaridad.
ZOLPIDEM	STILNOX Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar 10 ml de agua.	Administrar inmediatamente antes de la toma nocturna de NE, para conseguir un comienzo de su acción hipnótica inmediato. Valorar el empleo de la técnica de la dispersión de comprimidos.
ZONISAMIDA	ZONEGRAN Cápsulas	CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.		CÁPSULAS Abrir y dispersar en 20 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.
ZOPICLONA	LIMOVAN Comprimidos	COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar 10 ml de agua.		COMPRIMIDOS Pulverizar y dispersar 10 ml de agua.	Administrar inmediatamente antes de la toma nocturna.
ZUCLOPENTIXOL	CISORDINOL CLOPIXOL Gotas	GOTAS Diluir en 10 ml de agua.		GOTAS Diluir en 10 ml de agua.	Se puede administrar concomitantemente con la NE.

SNG: sonda nasogástrica, SG: sonda gastrostomía, SE: sonda entérica (nasoduodenal y nasoyeyunal), SY: yeyunostomía.