



## Cultivo + SARM

Cualquier otra localización positiva  
(orina, esputo, hemos, ulcera...)

Completar tripleta de frotis mucocutaneos (FN + FF + FI)

**1ª tanda erradicación (5 días):**  
lavados con gel clorhexidina (hibiscrub)  
mupirocina intranasal si FN positivo  
enjuagues con hexetidina si FF positivo  
**+ septrin F 1 c/12h 7 días**

Algún frotis mucocutaneo positivo

**2ª tanda erradicación (5 días):**  
lavados con gel clorhexidina (hibiscrub)  
mupirocina intranasal si FN positivo  
enjuagues con hexetidina si FF positivo  
**+ rifampicina 300 mg/12h 7 días**  
**+ doxiciclina 100 mg/12h x 7 días**

Esperar 48 h tras acabar tanda

Repetir set de frotis (1º post-tanda erradicación):  
tripleta mucocutaneo y foco primario

+

-

Esperar 1 semana  
Repetir set de frotis (2º post-tanda erradicación)

+

-

Esperar 1 semana  
Repetir set de frotis (3º post-tanda erradicación)

+

-

**3ª tanda erradicación (5 días):**  
lavados con gel clorhexidina (hibiscrub)  
mupirocina intranasal si FN positivo  
enjuagues con hexetidina si FF positivo  
**+ linezolid 600 mg/12h x 7 días**

**Tras la 3ª tanda**  
**portador crónico si**  
**algún cultivo positivo**

**ERRADICADO**

## Cultivo + SARM

Cualquier otra localización positiva  
(orina, esputo, hemos, ulcera...)

Completar tripleta de frotis mucocutaneos (FN + FF + FI)

**1ª tanda erradicación (5 días):**  
lavados con gel clorhexidina (hibiscrub)  
+ **septrin F 1 c/12h 7 días**

ningún frotis mucocutaneo positivo (solo foco primario)

Esperar 48 h tras acabar tanda

**2ª tanda erradicación (5 días):**  
lavados con gel clorhexidina (hibiscrub)  
+ **rifampicina 300 mg/12h 7 días**  
+ **doxiciclina 100 mg/12h x 7 días**

Repetir frotis de foco primario  
(1º post-tanda erradicación)

+

-

Esperar 1 semana  
Repetir frotis de foco (2º post-tanda erradicación)

+

-

Esperar 1 semana. Repetir set de frotis completo  
FN/F/I y de foco (3º post-tanda erradicación)

+

-

**3ª tanda erradicación (5 días):**  
lavados con gel clorhexidina (hibiscrub)  
mupirocina intranasal si FN +  
enjuagues con hexetidina si FF +  
+ **linezolid 600 mg/12h x 7 días**

**Tras la 3ª tanda**  
**portador crónico si**  
**algún cultivo +**

**ERRADICADO**

# Otras consideraciones

- **Mupirocina: 1 aplicación en cada fosa nasal cada 8 horas**
- **Hexetidina: enjuagues bucales sin diluir cada 8 horas**
- **El tratamiento de elección es la mupirocina (bactroban®) y no el ácido fusídico (fucidine®)**
- **El orden en intento de erradicación viene establecido por eficacia, toxicidad y coste-efectividad**
- **si las circunstancias clínicas lo precisan puede ser preciso alterar el orden de dichos intentos**

# Otras consideraciones

- **nunca deben realizarse los frotis si el paciente recibe tratamiento antibiótico activo frente a SARM**
- **en situación de infección (no colonización) por SARM deben aplicarse los tratamientos adecuados según guías vigentes coincidan o no con las pautas de erradicación siempre debe esperarse 48 h entre la suspensión de un tratamiento activo frente a SARM y la recogida de frotis de screening**
- **durante la espera de los resultados de cultivos de control de erradicación no deben realizarse lavados, enjuagues o tratamiento intranasal**